

Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects copyrights-free medical documents for non-lucratif use.
Some articles are subject to the author's copyrights.
Our team does not own copyrights for some content we publish.
"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however , we are not able to contact all the authors.
If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on: facadm16@gmail.com
All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.
Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.







Sur: www.la-faculte.net Espace E-learning pour apprentissage gratuit online Pour utilisation Non-lucrative

EXAMEN DE MICROBIOLOGIE 4ème ANNEE DE MEDECINE
4ème PERIODE ANNEE 1999/2000

Cocher la réponse juste ou fausse

1/ L'administration de sérum antirabique n'est pas nécessaire lors :
- a/ de léchage des muqueuses
- b/ de léchage d'une peau saine
- c/ de morsure profonde et unique
- d/ de morsure bénigne par carnivore sauvage
- e/ a + b

1

2/ Les virus des genres suivants peuvent être responsables d'infection chez l'enfant :
- a/ Morbillivirus
- b/ Rubivirus
- c/ Parvovirus B 19
- d/ herpes virus 6
- e/ Aucun de ces virus

1

3/ En cas de méningite bactérienne, la contre immuno électrophorèse (CIE) permet un diagnostic rapide grâce à :
- a/ La recherche d'antigènes bactériens solubles dans le LCR
- b/ La recherche de la sensibilité des bactéries aux antibiotiques
- c/ La culture bactérienne rapide
- d/ L'agglutination de particules de latex sensibilisées par différents anticorps.
- e/ La recherche des anticorps dirigés contre les bactéries dans le LCR

0

4/ Pour rechercher un germe anaérobie il faut respecter les règles suivantes.
- a/ Désinfection locale du site de prélèvement
- b/ Prélever à la seringue ou à l'écouvillon ordinaire
- c/ Eviter la pénétration de bulles d'air dans le prélèvement
- d/ Acheminer le prélèvement en moins d'une heure
- e/ Prélever avant toute antibiothérapie

1

facadm16@gmail.com Participez à "Q&R rapide" pour mieux préparer vos examens Participez aux forums

5/ L'agent HIV est caractérisé par :

a/ Sa résistance à la chaleur et à l'eau de Javel
b/ Sa possession d'une transcriptase inverse
c/ Sa large diffusion dans le monde.
d/ Sa transmission par voie sexuelle et sanguine
e/ Son extrême variabilité génétique

6/ Dans la famille des enterobacteriaceae, les principaux genres incriminés dans les affections entériques sont :

a) Proteus, Serratia, Yersinia
b) Escherichia, Salmonella, Shigella.
c) Staphylocoques, Campylobacter, Providencia
d) Erwinia, Levinea, Enterobacter.
e) Proteus, Enterobacter

7/ Un diagnostic viral rapide peut être demandé par les virus suivants :

a) Myxovirus influenzæ
b) Virus respiratoire syncitial
c) Rhinovirus
d) Adenovirus
e) Para influenza 1-2-3

8/ Les virus suivants sont responsables d'infections périnatales chez le nouveau-né :

a/ Cytomegalovirus
b/ Herpes simplex
c/ Parvovirus B 19
d/ Hepatite Virus B
e/ Enterovirus

9/ Les bactéries peuvent être incriminées dans les MST :

a/ Neiseria gonorrhoeae
b/ Haemophilus ducreyi
c/ Calymmatobacterium granulosis
d/ Gardnerella vaginalis
e/ Streptocoque du groupe B

Sur: www.la-faculte.net Espace E-learning pour apprentissage gratuit online Pour utilisation Non-lucrative

10/ Le diagnostic virologique de l'infection rabique se fait :

a/ A partir de la salive du sujet enragé
b/ A partir de la salive de l'animal mordeur
c/ A partir des cellules cérébrales de l'animal mordeur
d/ Par la réaction de neutralisation
e/ Par la réaction d'inhibition de l'hémagglutination

11/ Le prélèvement de selle pour coproculture bactérienne est :

a) Une selle fraîche du matin
b) Se fait dans un pot propre non obligatoirement stérile
c) Peut être conservé moins de 2 heures à + 4°C
d) Peut se faire dans un milieu de transport
e) Doit se faire chaque fois que possible par écouvillonnage rectal

12/ Le Bactéroides fragilis est une bactérie qui :

a) Peut être responsable de septicémie et de suppuration
b) Est Gram négatif, responsable parfois d'abcès du cerveau
c) Est un bacille anaérobie responsable d'abcès sous phrénique
d) Présente une résistance naturelle à la pénicilline
e) Toutes ces propositions sont justes

facadm16@gmail.com Participez à "Q&R rapide" pour mieux préparer vos examens Participez aux forums